## Przygotowanie do badania USG jamy brzusznej, miednicy, gruczołu krokowego przez powłoki brzuszne

- W przeddzień badania proszę nie spożywać pokarmów ciężko strawnych, wzdymających, surowych warzyw i owoców, jak również nie należy pić płynów gazowanych.
- Ok. godz. 14 dnia poprzedzającego badanie do wieczora tego samego dnia należy zażyć nabyte w Aptece, ESPUMISAN (3x2 kapsułki) lub WĘGIEL (3-4 tabl.).
- Gdy wykonujemy badania w godzinach popołudniowych: należy być na czczo 6 godzin przed badaniem.
- Ok. 1 godz. przed badaniem należy wypić 1,5 litra płynu nie gazowanego i nie oddawać moczu ( badanie odbywa się z wypełnionym pęcherzem).
- Nie palić papierosów, nie żuć gumy do żucia.
- Proszę zabrać ze sobą poprzedni wynik badania USG ( jeśli jest dostępny).

## Przygotowanie do badania USG jamy brzusznej, miednicy, gruczołu krokowego przez powłoki brzuszne

- W przeddzień badania proszę nie spożywać pokarmów ciężko strawnych, wzdymających, surowych warzyw i owoców, jak również nie należy pić płynów gazowanych.
- Ok. godz. 14 dnia poprzedzającego badanie do wieczora tego samego dnia należy zażyć nabyte w Aptece, ESPUMISAN (3x2 kapsułki) lub WĘGIEL (3-4 tabl.).
- Gdy wykonujemy badania w godzinach popołudniowych: należy być na czczo 6 godzin przed badaniem.
- Ok. 1 godz. przed badaniem należy wypić 1,5 litra płynu nie gazowanego i nie oddawać moczu ( badanie odbywa się z wypełnionym pęcherzem).
- Nie palić papierosów, nie żuć gumy do żucia.
- Proszę zabrać ze sobą poprzedni wynik badania USG ( jeśli jest dostępny).

## Przygotowanie do badania USG jamy brzusznej, miednicy, gruczołu krokowego przez powłoki brzuszne

- W przeddzień badania proszę nie spożywać pokarmów ciężko strawnych, wzdymających, surowych warzyw i owoców, jak również nie należy pić płynów gazowanych.
- Ok. godz. 14 dnia poprzedzającego badanie do wieczora tego samego dnia należy zażyć nabyte w Aptece, ESPUMISAN (3x2 kapsułki) lub WĘGIEL (3-4 tabl.).
- Gdy wykonujemy badania w godzinach popołudniowych: należy być na czczo 6 godzin przed badaniem.
- Ok. 1 godz. przed badaniem należy wypić 1,5 litra płynu nie gazowanego i nie oddawać moczu ( badanie odbywa się z wypełnionym pęcherzem).
- Nie palić papierosów, nie żuć gumy do żucia.
- Proszę zabrać ze sobą poprzedni wynik badania USG ( jeśli jest dostępny).